

Г 95

Г.Л. ГУРЕВИЧ

КОМОРБИДНЫЕ
РАССТРОЙСТВА
В НАРКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКЕ

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ПРЕДИСЛОВИЕ | 5 |
| ГЛАВА I. Современное состояние учения | |
| о коморбидных расстройствах | 8 |
| 1.1. Проблема коморбидных расстройств в наркологии и психиатрии | 8 |
| 1.2. Вопросы клиники и диагностики сочетанной аффективной патологии | 14 |
| 1.3. Современное состояние учения о шизоаффективных психозах | 18 |
| 1.4. Подходы к терапии коморбидных состояний | 23 |
| 1.4.1. Патогенетические механизмы действия антидепрессантов на аффективную патологию и влечение к алкоголю | 24 |
| 1.4.2. Обоснованность использования атипичных антipsихотиков в лечении эндогенных психозов и алкогольной зависимости | 24 |
| 1.4.3. Патогенетические механизмы использования антиконвульсантов в терапии алкоголизма и аффективных психозов | 26 |
| ГЛАВА II. Клинико-психопатологическая характеристика больных с сочетанными формами алкогольной зависимости | 28 |
| ГЛАВА III. Алкогольная зависимость и биполярное аффективное расстройство | 36 |
| ГЛАВА IV. Алкогольная зависимость и шизоаффективное расстройство | 73 |
| ГЛАВА V. Дифференцированные подходы к терапии коморбидной патологии, профилактика рецидивов | |
| 5.1. Купирование алкогольного абстинентного синдрома (ААС) | 87 |
| 5.2. Купирование патологического влечения к алкоголю (ПВА) | 89 |
| 5.2.1. Использование ремерона (миртазапина) в терапии ПВА у больных с аффективной патологией | 91 |

| | |
|--|-----|
| 5.2.2. Использование рисполепта (рисперидона) в терапии ПВА у больных с аффективной патологией | 93 |
| 5.2.3. Использование ламиктала (ламотриджина) в терапии ПВА у больных с аффективной патологией | 96 |
| 5.3. Поддерживающая терапия, направленная на формирование стабильных ремиссий | 98 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ | 101 |
| БИБЛИОГРАФИЯ | 111 |